Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

observation n.° 114.

sur

un Bec de lièvre de naissance, traité par le vésicatoire, par m. viguerie de toulouse. chirurgien de l'hôtel dieu

une petite demoiselle de 4 ans, fille de m. maison, - postulant à la bourse de toulouse, logée Rue et - paroisse du taur, portoit de naissance un bec de lièvre à la lèvre supérieure. le 2 juillet 1778 on la mit entre mes mains pour en être guérie; le même jour - j'entamai la difformité au moyen de l'emplatre - vésicatoire que je Conteins sur la partie par deux - languettes de taffetas dont je couvris les bords, d'emplatre d'andré de la croix, et j'assujettis le tout par le bandage de l'ingenieux m. Louis, ou à double Boutonnière, qui m'a Constamment réussi dans l'opération du bec de lièvre. je levai l'appareil 24 heures après et je - trouvai les extrémités des emplatres, que j'avais repliées entre la lèvre et la gencive, détachées, les bords internes du bec de lièvre n'étaient pas assez entamés; j'appliquai de nouveaux emplatres, et à la levée de ce second - appareil, je trouvai les bords du bec de lièvre assez divisés pour pouvoir s'agglutiner, à la faveur du même bandage: le 4.e jour, les cris, les pleurs, les mouvemens Continuels de cet enfant, m'ayant obligé de lever ce troisième - appareil, je vis avec plaisir que l'agglutination se faisoit extérieurement, mais que les bords internes étaient - gonflés et n'avaient point de disposition à se réunir dans le tiers inférieur seulement de la division: j'eus encore

ARC 53 n° 67

recours au bandage unissant que j'assujettis du mieux qu'il me feut possible, pour favoriser l'entière réunion. à la levée de ce quatrième appareil, je trouvai cette réunion parfaite dans les points où je m'étois déjà aperçu qu'elle commençait à se faire, et que la division étoit toujours la même dans son tiers inférieur de la face interne, les bords formoient par leur écartement une petite goutière triangulaire: cette goutière ne rendant point la petite malade difforme, ses parens me parurent d'abord assez contens; mais ils changerent bientôt de langage et de façon de penser sur le succès de mon opération, et ils me dirent le lendemain, que si j'eusse cousu la lèvre à leur fille, elle n'aurait pas cette goutière qui vraisemblablement augmenterait tous les jours et la rendrait plus difforme. les tracasseries continuelles de ces parens et plus encore le mauvais procédé d'une personne de l'art, qui disait vouloir reparer ma faute, me déterminerent à entamer avec mon bistouri les bords de la partie inférieure de la goutière, à y pratiquer une échancrure qui comprenait le tiers inférieur du bec de lièvre primitif et à y faire un point de suture: tout cela me devint inutile, malgré mon bandage d'adoption que j'appliquai pour favoriser la réunion. le 4.e jour le point de suture feut déchiré par les cris, les pleurs et les mouvemens redoublés de l'enfant; tous mes soins ont été inefficaces, la réunion est imparfaite, et il reste une petite —

échancrure presqu'-imperceptible au tiers inferieur du
bec de lièvre.

Réflexion

quoique mon opération n'aye point d'abord été suivie de
tout le succès que je m'en étais promis; je n'en suis pas -
moins persuadé qu'elle l'aurait été dans la suite, si
d'un côté j'eusse refusé Constamment aux parens de
coudre la lévre de la malade, ce à quoi je n'avois point
voulu condescendre; et si de l'autre j'eusse méprisé les
propos indécens que la jalousie et l'ignorence mettaient
dans la bouche de quelque Confrère qui ne Connaissait -
sans doute que l'ancienne méthode: le motif qui me porte
à croire que la petite goutière inférieure et interne
du bec de lièvre serait aujourd'hui effacée et que la Cure
en serait parfaite, c'est qu'une goutière plus grande -
à Resté à la lévre du Cocher de M. le Baron de Lahage,
président à mortier du parlement de toulouse, —
quelque temps après l'opération, et que j'ai eu la
satisfaction de la voir disparaitre, et le malade guèri
radicalement par le seul Bandage à double Boutonnière.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE